Un nuevo Castniidae argentino

Castnia uruguayana **Champaquiensis** nov. ssp.

por Alberto Breyer

En Enero de este año he hecho una excursión a la cumbre del cerro "Champaqui", que tiene una altura de 2.800 metros, estando situado en Córdoba, cerca de Villa Dolores.

Su formació ngeológica es conocida, y por ser granítica como su vegetación, es más vale pobre. En efecto, faltan árboles, y hasta arbustos escasean. En cambio, entre los bloques de piedra se extienden matas de abundantes plantas bajas y entre ellas crecen algunas tunas. Este último detalle es interesante, pues es sabido que las orugas de una especie de *Castnia* viven en las tunas y se nutren de ellas, y bien podría ser que la existencia allí de las tunas explique la presencia de la subsp. nueva de la *Castnia uruguayana*, que ha tenido la suerte de cazar en esta excursión.

La conocida *Castnia uruguayana* Burm. ha sido descubierta y cazada únicamente a orillas del Río Uruguay, cerca de la ciudad de Salto (Rep. del Uruguay), de manera que hay una enorme distancia entre este punto y el lugar donde yo conseguí mi ejemplar, aparte de la diferencia grande de altura. En efecto, mi ejemplar presenta diferencias notables comparándolo con la forma original, y por lo tanto la describiré a continuación como

Castnia Uruguayana **Champaquiensis** subsp. nov.

Tamaño, dibujo y hábito en general igual al *tipo* de Burmeister, que está conservado y en excelentes condiciones en las colecciones del Museo Nacional de Historia Natural Bernardino Rivadavia en Buenos Aires. Por lo tanto, la mejor descripción consiste en detallar la diferencia entre *Uruguayana* y la nueva subespecie, como puede observarse en la foto adjunta, que debemos a la gentileza del señor Director del Museo Nacional Profesor Martín Doello Jurado, a quien nos hacemos un deber agradecer la valiosa colaboración y atenciones que nos ha dispensado en todo momento, favoreciendo grandemente nuestros estudios.

En las alas posteriores, todas las manchas que son blancas en *Uruguayana*, resultan ser de un color amarillo opaco anaranjado en la nueva ssp. **Champaquiensis**, m.

En las alas anteriores falta casi por completo la mancha blanca discocelular; la faja oblicua blanca tiene una pronunciada interrupción sobre la segunda mediana, que en el tipo y en todos los ejemplares típicos sigue sin esta interrupción.

Patria: Córdoba (República Argentina).

Localidad típica: Cerro Champaquí, Sierras de Córdoba, a 2.400 metros de altura.

Tipo: único en mi colección.

La gran distancia que separa las dos regiones de donde conocemos ahora esta bella especie de *Castnia* y la gran altura sobre el nivel del mar en que se cazó el ejemplar nuevo, me hacen suponer que se trata de una raza local específica, y el hallazgo de más ejemplares comprobará esta aseveración.

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1929.



Castnia uruguayana Burm
(según Seitz) × 1 ½.



Castnia uruguayana **champaquiensis**
Breyer n. ssp. × 1 ½



Castnia uruguayana Burm × 1 ½

(Foto-tipo, colección del Museo Nacional de Historia Natural de Buenos Aires).